

«ИНЯШКА» – НОВАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ РЫБА НА КАМЧАТКЕ**С.С. Григорьев*, Н.А. Седова******Камчатский филиал УРАН Тихоокеанского института географии (КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский****Камчатский государственный технический университет (Камчат-ГТУ), Петропавловск-Камчатский***“INYASHKA” – A NEW COMMERCIAL FISH IN KAMCHATKA****S.S. Grigoriev*, N.A. Sedova******Kamchatka Branch of Pacific Geophysical Institute (KB PGI) FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky****Kamchatka State Technical University (KamchatSTU), Petropavlovsk-Kamchatsky*

Во второй половине апреля 2011 г. на прилавках городского рынка Петропавловска-Камчатского появилась необычная для торговой сети мелкая рыбка под названием «иняшка» (рис. 1). Она была привезена из Усть-Камчатска и поймана в р. Камчатке. По сообщению продавцов, в прошлом жителей Усть-Камчатска, местное население ловит эту рыбу в большом количестве и использует ее в пищу.



Рис. 1. Иняшка на прилавке городского рынка

Видовая идентификация иняшки показала, что она является мелкой малоротой корюшкой *Nipomesus olidus* (Pallas, 1811), которая внешне больше напоминает кильку (рис. 2). Существенное отличие иняшки от последней – наличие жирового плавника, который в глаза не бросается. Немаловажно и то, что у нее отсутствует столь характерный для корюшек огуречный запах.

«Внешне похожа на кильку» – именно такой признак указывает Н. А. Мягков (1993) в качестве основного для речной малоротой корюшки

в атласе-определителе рыб. В числе других признаков там же приводится число жаберных тычинок 27–34. По телу проходит серебристая полоса. По краю чешуек и лучам плавников разбросаны черные точки. Длина тела до 10 см. Обитает в опресненных участках моря от Берингова пролива до северного побережья Японии.

На Камчатке существуют проходная и локальные (озерные и озерно-речные) формы малоротой корюшки. Известно, что этот вид обладает значительной пищевой пластичностью и выступает как планктофаг, бентофаг и хищник, либо поедает упавших на поверхность насекомых в зависимости от доступности кормовых организмов. Также известно, что в отдельных районах и речных системах Дальнего Востока, где проходная малоротая корюшка бывает достаточно многочисленной и имеет сравнительно крупные размеры, она служит объектом местного промысла и любительского рыболовства. Как правило, промысловой статистикой эта корюшка не учитывается, или учитывается вместе с более крупной и важной в промысловом отношении зубастой корюшкой. Считается, что в настоящее время в бассейне р. Камчатки малоротая корюшка промыслового значения не имеет, хотя в прошлом ее использовали в пищу. В середине XVIII в. в бассейне р. Камчатки камчадалы употребляли в пищу малоротую корюшку. Вот как описывает ее Г.В. Стеллер (1774): «В реке Камчатке есть рыба, поднимающаяся с моря весною и в течение всей зимы в огромнейшем количестве вылавливаемая вблизи горячих ключей. Обычно ее сачками вытаскивают из прорубей во льду. Она, говорят, очень вкусна, но у тех, кто ест ее впервые, она вызывает сильные желудочные боли. Ительмены называют ее „инаха“». С. П. Крашенинников (1755) также упоминает малоротую корюшку р. Камчатки, но называет ее несколько по-другому – «инняхя» (цит. по Бугаев, 2007. С. 52).

Иняшка в продаже имела длину (стандартную) 81–113 см и индивидуальную массу 4–20 г. Несмотря на мелкие размеры, почти все рыбы были половозрелыми (рис. 3).



Рис. 2. Иняшка внешне напоминает кильку




Рис. 3. Половозрелые самец и самка иняшки

Морфометрический анализ иняшки показал следующие результаты. Наибольшая высота тела 21–22 мм, наименьшая высота тела 6,0–8,0 мм, диаметр глаза 5,4–5,8 мм, антеанальное расстояние 6,8–7,2 мм, длина головы 23–24 мм, длина верхней челюсти 7,0 мм. Меристические признаки иняшки следующие: D II 7, A II 12–13, P I 10, V I–II 7; лучей в хвостовом плавнике: сверху 11–13, снизу 11, по центру 20–21; жаберных лучей 6; жаберных тычинок $11+(15-18)=26-29$; чешуй по средней линии тела 54–57; прободенных чешуй в боковой линии 11–13. Абсолютная индивидуальная плодовитость – 14–15 тыс. икринок. Диаметр икринок из ястыков – 0,50–0,55 мм. Возраст – 3 года.

Вероятно, доставленная в Петропавловск и поступившая в продажу иняшка была та самая рыба, которую, по сообщению Г.В. Стеллера, сачками вытаскивали из прорубей во льду вблизи горячих ключей, куда она в огромном количестве поднималась с моря. Верными оказались сведения и о высоких вкусовых качествах иняшки. По вкусу она не уступает крупной малоротой корюшке, а зубастую (азиатскую) даже превосходит. Но слухи о якобы вызываемых ею сильных желудочных болях у тех, кто ее ест впервые, оказались ложными, и это авторы проверили на себе. Так что напрасно покупатели относились к этой мелкой рыбке с недоверием. Можно ожидать, что в условиях чрезмерной эксплуатации традиционных промысловых объектов такие новые объекты промысла, как иняшка, будут все чаще появляться в продаже.

ЛИТЕРАТУРА

- Бугаев В. Ф. 2007. Рыбы бассейна реки Камчатки (численность, промысел, проблемы). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс. – 192 с.
- Мяжков Н.А. 1993. Атлас-определитель рыб. Учебное издание. – М. : Изд-во «Просвещение». – 288 с.